Angine Erythémato-pultacée

① Augmentin : 80mg/kg/j — GSP 10j

→ Enfant < 30kg
- Augmentin sirop NRSIE — GSP 10j
01 ddp 03x/j

→ Enfant > 30kg
Augmentin sachet — GSP 10j
01 sachet 3x/j

25 - 35kg = sachet 500mg

> 35kg = sachet 01g

→ Si allergie : Josacine
ou
récidive

acine sirop ——— 05 j
ssp 7j
os ddp 02 x 1j

0 - 5 kg = 125 mg
5 - 20 kg = 250 mg
> 20 kg = 500 mg

② Doliprane :

↳ Enfant :

Doliprane supp ——— 01 toute
01 suppo / 6h si fièvre

< 8 kg = 100 mg
8 - 12 kg = 150 mg
13 - 20 kg = 200 mg
> 20 kg = 300 mg

34 | 2

↳ grand Enfant:

Doliprane cp 500mg ——— (01 bl

01 cp 1 6h si fièvre

Angine Erythémateux

1) Clamoxyl ——— 8SP 10j

50mg/kg/j max = 2g/j

Enfant

Sirop		1 cà m
0 - 5 kg	125 mg	02 x 1/j
5 - 10 kg	250 mg	02 x 1/j
10 - 15 kg	250 mg	03 x 1/j
15 - 20 kg	500 mg	02 x 1/j
> 20 kg	500 mg	03 x 1/j

0kg 5kg 10kg 15kg 20kg

125mg 250mg 250mg 500mg 500mg

→ pour le grand Enfant =

↘ Clamoxyl cp 01g ——— (BSP 10j)

01 cp 02 x 1j

② Doliprane ——— (si besoin)

15 mg / kg / j

↳ Enfant 01 suppo / 6h si fièvre

< 8kg = 100 mg

8 - 12kg = 150 mg

13 - 20 kg = 200 mg

≥ 20kg = 300 mg

↳ grand Enfant

↳ Doliprane cp 500mg ——— (si besoin)

01 cp / 6h si fièvre

4

4) Si allergie à l'amoxicilline

Josacine. sirop _____ 7j

ddp 02 x 1g

0 - 5 kg	=	125 mg
5 - 20kg	=	250 mg
> 20kg	=	500mg



Fièvre

↳ Enfant :

Doliprane : suppo ——— 01 bte

01 supp / 6 h si fièvre

- < 8 kg : 100 mg
- 8 - 12 kg = 150 mg
- 13 - 20 kg = 200 mg
- > 20 kg = 300 mg



↳ S'il présente une diarrhée :

Efferalgan sirop (E) ——— 01 bte

01 ddp / 6 h si fièvre

ou

Doliprane sirop ——— 01 bte

01 ddp / 6 h si fièvre

6

↳ le grand Enfant.

Doliprane cp ou sachet 500mg — (1 boîte

01 cp / 6h si fièvre

fièvre + Détresse Respiratoire

⇒ TTX (maternité)

Si fièvre > 40°C ajouter avec supp

Algifen sirop — (1 flc

01 ddp / 6h

CI < 6 mois

ATB

Toux

Prospan sirop — 01 flc

01 cac — 02 x 1 ʒ — NRS
01 cac — 03 x 1 ʒ — enfant
02 cac — 03 x 1 ʒ — grand E

OU

Toux Rid sirop — 01 flc

01 cac — 02 x 1 ʒ — NRS
01 cac — 03 x 1 ʒ — E
02 cac — 03 x 1 ʒ — grand E

8

Maxilase sirop (Idem)

NRS

une Toux < 6 mois

il faut la respect c'est un moyen de défense

Allergie Cutanée (Urticaire)

surdécès de la peau en plage.

PDF

injection AHC en IM.

5mg/kg (max = 100mg)

surveillance 1h

si ↓ rougeur et recherches Effets II autres

* si pas de reponse renouveler

* si pas de réponse adrénaline.

TRT de Sortie

Anti-histaminique :

- < 1 an — Primalon — sirop 05 flc
- 1 - 4 ans — Histagan — "
- > 4 ans — Polaramine ou Loratidine — "

01 cac — 02 x 1 j

↳ pr le grand Enfant :

(02 cac x 2 l j)

(ou) pour grand Enfant :

Telfast = cp 180 mg — (05 bt

01 cp 1 j le soir

+

Solupred cp 20mg — disp 5 j

02 cp 1/2 le matin à jeun

(04)

Crise d'asthme

02 seances d'aérosol

{0,03 cc 1kg de Salbutamol

dilués dans 04 cc de SSI 9%

0,03 dose min

01cc dose max > 30kg

si pas d'amélioro

+/- injecD de Solumédrol

02 mg 1kg

dose min 20mg

dose max 60mg

en IM +02 seances aérosol

Max = 06 seances d'aerosol

11

TRT de Sortie

① Ventoline Spray ——— QSP 7J
(salbutamol)
02 bouffées 03 x 1J

② Célestène gouttes ——— QSP 05J
10 gouttes 1kg le matin après repas

ou

Solupred cp 20mg ou 5mg ——— QSP 5J
(1 mg/kg) calculé le matin après repas

+/- Clamoxyl ——— QSP 08J

12
34

Aphtes buccales

① Fungizone sol/O _____ (01 fl

01 app 03 x 1 j

+/- ② Daktarin gel _____ (01 fl

01 App 02 x 1 j

Chalazia شعيرة

① Rifamycine collyre _____ (01 Bte

01 gouttes / oeil 02 x 1 j

② Fucithalmique collyre _____ (01 Bte

01 gttes / oeil 03 x 1 j

③ Lavage : SSI

13 15

Conjonctivite

↳ Si écoulement jaunâtre =

① Rifamycine collyre ——— (5 à 7 j)
os gouttes 1 œil ou x 1 j

② Rifamycine Pommade ——— (5 à 7 j)
os App le soir

↳ Si écoulement clair = (viral)

Vitabact collyre ——— (5 à 7 j)
os gouttes 1 œil ou x 1 j

Douleurs Abdominales

① Spasfon : ——— (01 bte

↳ le petit enfant :

Spasfon : lyoc ——— (01 bte

01 lyoc 03 x 1 J

↳ le grand enfant :

Spasfon : cp 80mg ——— (01 bte

01 cp 03 x 1 J

② Débridat : ——— (01 bte

↳ le petit enfant :

Débridat sirop (E) ——— (01 flc

01 càm 03 x 1 J

15

le grand enfant :

Déloxidat cp 500mg ——— (01 boîte)

01 cp 03 x 1j

+/- ③ Bedilex : Sachet ——— (01 boîte)

01 sachet 03 x 1j

Douleur de la FID

avis CCI

Infection Urinaire

- Fièvre inexpliquée
- Polyurie
- Brûlures mictionnelles
- DLR lombaire ou FID.

Labstix

si infect° urinaire = Nitrite ⊕
Leucocyturie ⊕

Si ⊖

TRT sympto

IU:

oroken sirop ddp 02x1j

0-2 ans 10mg/j
> 2 ans 40 mg/j

Si ⊕

Faire ECBU + Antibiogramme Privé

+ Soulager douleur avec spasfon + Doliprane

17

Labstix

Prot ⊕

et sang + + +

⇓

Colique Néphrétique

Si Patient diabétique avec IU

ne pas attendre l'antibiogramme

TRT d'emblée avec

Ciprolon cp 01 cp/j

18

34

Colique néphrétique

en urgence :

- 01 injection de Voltarène en IM
- +/- spasfon en IV

à la sortie

(AINS)

1. Votrex cp 50mg — (8SP/5j)
   01 cp/j le soir
2. Oméprazole cp 20mg — (osbtc)
   01 cp/j le matin à jeun.

Ne jamais associer ATB avec AINS ⇒ risque de cellulite

19.

→ On peut donner Pour colique Néphrétique

Nuflorile suppo _____ 5j

01 suppo 02 x 1j

NRS = suppo 200mg

(E) = suppo 400mg

Vomissements

↳ Enfant = (Nné – NRS)

Vomitéb sirop ——— (01 fle

01 ddp 03x1j

↳ > 2 ans :

Dompéridone sirop ——— (01 fle

01 ddp 03x1j

+ RHD

+ adulte = boire bep d'eau + +

+ Enfant : - SRO sachet (saidal)

——→ 01 bte

01 sachet (saidal) dans 01 l d'eau de robinet (le reste des marque selon la notice) = eau bouillie

réfroidie (la Bouteille tient 24h

↳ 50 cc au cas après chaque Vomissement

2e

24

Diarrhée

① Tiorfan : sachet 10mg ——— (01 à

01 sachet 03 x 1j (> 3 ans)

1/2 sachet 03 x 1j (< 3 ans)

② Smecta : sachet ——— (01 à 02 c

1/2 sachet 03 x 1j (E)

01 sachet 03 x 1j (A) < 1,25 mg 2000 mg

③ Flagyl (ATB) sirop ← 30 mg/kg/j ——— (08 à 08 j

01 cà m 02 x 1j

(si présence de glaires et fièvre)

④ SRO : sachet ——— (01 à 02 c

01 sachet (Sidal) dans 01 L d'eau bouillie et refroidie

50 cc < 2 ans après chaque selle

100 cc Si > 2 ans

Primpéran ? qd est ce qu'on le donne ?

Bactrim ?

54

Laryngite

- dyspnée inspiratoire
- râles sibilants
- rondité de voix

abaisse langue CI

légère à modérée = rondité de la voix

Célestène gouttes ——— 08h05 J

10 gouttes 1kg le matin
(à jeun ou après repas)

Sévère
- rondité de la voix
- stridor laryngé
- détresse respiratoire

01 séance de Cocktail laryngé

- 01 cc d'Adrénaline
- 02 cc de dexaméthasone
- 03 cc de SSI

sur 20 min

25

Injection de + dexaméthasone

0,5 x poids en IM

confirmés

⇓

évaluaO après 1h ⟶ à répeter si nécessaire

↳ On peut donnes au lieu du Cocktail =

Solumédrol injection en IM

(1 mg / kg)

⇓

TRT Sortie

Solupred. cp 5 mg ——— 08P05 J

(1 mg / kg) = une seul prise le matin

calcul cp

26

Eruption Cutanée = Virose

= rougeole, rubéole, Varicelle

① Histagan : sirop ——— 01 flc
01 cà m — 02 x 1 j ou le soir

② Hexamédine solu ——— 01 boîte
01 App — 03 x 1 j

③ Paracétamol : Si surinfection à Strépto ⇓

Keforal sirop (E) ——— 01 flc
01 ddp — 03 x 1 j

Hexamédine solu ——— 01 flc
01 App — 05 x 1 j

Zeta crème ——— 01 tube
01 App — 02 x 1 j


Histelgan sirop
1 cà m le soir
1 fle
2

Constipation :

① Dévoridat sirop ——— (01 fl

01 dd p 03 x 1 j

↳ Si (E) > 12 ans =

Trimébutine cp ——— (01 bte

01 cp 02 x 1 j

Forlax sachet

② Duphalac sirop 4g ——— (01 flc

< 1 an	1 cc	01 x 1 j
1 - 6 ans	1 cc	02 x 1 j
> 6 ans	1 cc	03 x 1 j

③ Glycérine suppo ——— (01 b

01 _ 02 suppo 1 j

2 1

Les Oreillons

d'Θ = virale Pas de TRT

juste un TRT sympto.

↳ Urgéril suppo 400mg ——— (orbite)

on suppo le soir

Convulsion

↳ (Nné < 1 mois) =

Gardinal en Perfusion
(phénobarbital)

020 mg/kg dilué ds 60 cc
de SSI en IVL pdt 20 min

↳ (NRS) (E) (A)

> 1 mois

Valium (Diazépam) = en IV
poids/2 = dilué ds un
03 cc de SSI
(sans dépasser 10 mg max)
à répéter 02 à 3 fois/J pas plus +++

Convulsion fébrile < 9 mois ⇒ PL
On a pas besoin de faire fond d'oeil comme pour adulte.

31 3

1

Poussée dentaire

- 6 mois — 02 incisives inf.
- 9 mois — 02 " sup
- 14 mois — les molaires
- 18 mois — les canines

① Dodogel ——— (01 tube

01 App gel buccal 02 x 1 j

② Dolodent ——— (01 tube

solut gingivale

01 App 03 x 1 j

Conseils

Ingestion Caustique

- TLT
-
- FOGD dans les 24h
- arrêt d'alimentation oral

Appétit (Anorexie)

Appétito sirop ——— ampl

01 cac	03 x 1 j	< 3 ans
02 cac	03 x 1 j	3 - 6 ans
03 cac	03 x 1 j	> 6 ans.

Anémie ferriprive

1/4 avant repas

Ferrum gouttes ——— 08 à 03 mois

04 gouttes / kg ⟶ de 01 mois

02 goutte / kg ⟶ 2e à 3e mois

Poids :

> 4 ans : 2 x âge + 8

- naissance : 3,3 ± 0,5 kg
- 6 mois : Pds de naissance x 2
- 1 ans : " x 3
- 2 ans : " x 4

Node Book

FC
FR
Note Book
2mois - 1an <160 bat/min
1-5ans <120 bat/min
>5ans <110 bat/min
2mois - 1an <50 cycles/
1-2ans <40 cycles/
>2ans <30 cycles/